

AIDS E OUTRAS DSTs

INFORMAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA PREVENÇÃO





O QUE SÃO DOENÇAS
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS?

DSTs

SÃO DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS E BACTÉRIAS TRANSMITIDOS DURANTE O ATO SEXUAL OU PELO CONTATO COM SÊMEN, FLUIDO VAGINAL E SANGUE, OU DA MÃE PARA O FILHO DURANTE A GESTAÇÃO, PARTO OU AMAMENTAÇÃO.

HIV

O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) É O CAUSADOR DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). O VÍRUS DANIFICA O SISTEMA IMUNOLÓGICO, IMPEDINDO QUE O ORGANISMO COMBATA INVASORES QUE CAUSAM DOENÇAS, DEIXANDO A PESSOA MAIS VULNERÁVEL A INFECÇÕES OPORTUNISTAS.

O HIV não tem cura, mas a Aids tem tratamento, que é, inclusive, disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

VÍRUS ≠ DOENÇA

ALGUMAS PESSOAS PODEM TER O HIV E MANIFESTAR SINTOMAS DA AIDS DEPOIS DE MUITO TEMPO OU ATÉ MESMO NUNCA TER QUALQUER SINAL DELA.

PEP (PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO AO HIV)

SE VOCÊ PASSOU POR ALGUMA SITUAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, PROCURE UM POSTO DE SAÚDE E INICIE O TRATAMENTO COM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (TARV). O TRATAMENTO DURA 28 DIAS E EVITA A SOBREVIVÊNCIA E MULTIPLICAÇÃO DO HIV.

HPV

O **PAPILOMA VÍRUS HUMANO**
TEM MAIS DE CEM VARIAÇÕES.

A MAIORIA DOS VÍRUS DO HPV NÃO CAUSA GRANDES COMPLICAÇÕES E PODE SER COMBATIDA PELO PRÓPRIO ORGANISMO. MAS ALGUNS TIPOS MAIS GRAVES PODEM CAUSAR VERRUGAS GENITAIS, LESÕES NA BEXIGA, CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, VAGINA, ÂNUS E PÊNIS.

*Não há cura para o vírus,
apenas tratamento para os sintomas
e vacinas preventivas.*

VACINAS PREVENTIVAS:

BIVALENTE

PREVINE OS VÍRUS DO TIPO 16 E 18, RELACIONADOS A LESÕES GENITAIS PRÉ-CANCEROSAS.

QUADRIVALENTE

PROTEGE CONTRA OS VÍRUS 6 E 11, RELACIONADOS AO APARECIMENTO DE VERRUGAS GENITAIS, E TAMBÉM CONTRA OS TIPOS 16 E 18.

HTVL

O VÍRUS LINFOTRÓPICO T HUMANO É DA MESMA FAMÍLIA DO HIV E PODE CAUSAR INFECÇÃO CRÔNICA. EXISTEM DOIS TIPOS: HTVL 1 E 2.

*Não há tratamento específico.
O paciente deve ser acompanhado para
evitar e tratar as possíveis
complicações associadas à doença.*

HTVL1

PODE CAUSAR LEUCEMIA, DOENÇAS NEUROLÓGICAS DEGENERATIVAS (PARAPARESIA ESPÁSTICA TROPICAL), POLIMIOSITES, POLIARTRITES, UVEÍTES E DERMATITES.

HTVL2

ATÉ O MOMENTO NÃO FOI IDENTIFICADA NENHUMA PATOLOGIA ASSOCIADA A ESSE VÍRUS.

GONOR- REIA

SEGUNDO RELATÓRIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA (SBI), A GONORREIA, CAUSADA PELA BACTÉRIA NEISSERIA GONORRHOEAE, É A DST MAIS COMUM NO PAÍS.

INFECTA OS ÓRGÃOS GENITAIS, RETO, ARTICULAÇÕES E OLHOS. E TAMBÉM É TRANSMITIDA DE MÃE PARA FILHO NA HORA DO PARTO.

O tratamento é simples, mas deve ser feito corretamente, caso contrário, a doença pode causar infertilidade.

OS SINTOMAS MAIS COMUNS SÃO:

HOMENS

SENSAÇÃO DE ARDOR OU QUENTURA AO URINAR, CORRIMENTO OU PUS, E DOR NOS TESTÍCULOS.

MULHERES

DOR AO URINAR OU NO BAIXO VENTRE, CORRIMENTO, SANGRAMENTO FORA DO PERÍODO MENSTRUAL E DOR OU SANGRAMENTO DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL.

CLAMÍ- DIA

É CAUSADA PELA BACTÉRIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS E ATINGE AMBOS OS SEXOS.

Existe tratamento, mas se o diagnóstico for tardio, pode levar a complicações como: epididimite, inflamação na próstata, artrite reativa e infertilidade. Nas mulheres, pode causar problemas nas trompas e gravidez ectópica.

QUANDO SURGEM, OS SINTOMAS SÃO:

HOMENS

SENSAÇÃO DE QUEIMAÇÃO AO URINAR, SECREÇÃO NO PÊNIS, SENSIBILIDADE OU DOR NOS TESTÍCULOS, E DOR OU SECREÇÃO RETAL.

MULHERES

SENSAÇÃO DE QUEIMAÇÃO AO URINAR, DOR NO ATO SEXUAL, DOR OU SECREÇÃO RETAL, E SECREÇÃO VAGINAL.

SÍFILIS

CAUSADA PELA BACTÉRIA *TREPONEMA PALLIDUM*, O CONTÁGIO SE DÁ PELO CONTATO SEXUAL, DIRETO COM FERIDAS OU SANGUE CONTAMINADO, OU DA MÃE PARA O FILHO DURANTE A GESTAÇÃO (SÍFILIS CONGÊNITA).

O tratamento é feito com antibióticos que são oferecidos gratuitamente pelo SUS.



PRIMÁRIA

APÓS TRÊS SEMANAS DO CONTÁGIO, SURGEM FERIDAS CHAMADAS DE CANCRO DURO, COM UMA ESPÉCIE DE CASCA ENDURECIDA OU AVERMELHADA, NAS PAREDES VAGINAIS, PERÍNEO, COLO UTERINO, PREPÚCIO, BOCA, NARIZ E DEDOS.

SECUNDÁRIA

6 A 8 SEMANAS DEPOIS DO ESTÁGIO PRIMÁRIO, APARECEM MANCHAS NA PELE, LÍNGUA, MAL-ESTAR, FALTA DE APETITE E PERDA DE PESO.

TERCIÁRIA

LESÕES MAIORES, PROBLEMAS NO CORAÇÃO, NERVOS, OSSOS, MÚSCULOS, FÍGADO E VASOS SANGUÍNEOS, CONVULSÃO, PERDA AUDITIVA, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) E ALUCINAÇÕES. ESSES SINTOMAS PODEM SURGIR ATÉ 30 ANOS APÓS A FASE PRIMÁRIA.

HERPES GENITAL

INFECÇÃO VIRAL CAUSADA PELOS VÍRUS DO TIPO 1 (HSV1) E TIPO 2 (HSV2), QUE SE MANIFESTA COMO PEQUENAS BOLHAS EM VOLTA DO DOS LÁBIOS, GENITAIS OU EM OUTRAS PARTES DO CORPO.

O contágio se dá pelo contato sexual, direto com as lesões ou pelo compartilhamento de objetos pessoais. Ainda não existe cura ou vacina para esse vírus, apenas tratamento para sintomas.

GRAVIDEZ

A MAIORIA DAS TRANSMISSÕES OCORRE PELO CANAL DO PARTO E PODE CAUSAR A MORTE DO BEBÊ OU DEIXAR SEQUELAS. POR ISSO, QUANDO A MÃE TEM HERPES GENITAL, É INDICADO O PARTO CESARIANA. O TRATAMENTO DEVE SER FEITO DURANTE A GRAVIDEZ PARA EVITAR A TRANSMISSÃO PARA O BEBÊ AINDA NA BARRIGA DA MÃE. SE O VÍRUS É CONTRAÍDO DURANTE A GESTAÇÃO, PODE CAUSAR ABORTO OU INTERFERIR NO CRESCIMENTO DO FETO.

TRATAMENTO

É FEITO COM MEDICAMENTOS ANTIVIRAIS EM POMADA OU COMPRIMIDOS QUE AJUDAM A DIMINUIR A MULTIPLICAÇÃO DO VÍRUS E DIMINUIR AS BOLHAS.

HEPA- TITES VIRAIS

CONHEÇA OS TIPOS DE VÍRUS
E O QUE CADA UM CAUSA.

→ Existem outros tipos de hepatites,
mas que não são sexualmente transmissíveis.

HEPATITE B

CONTÁGIO PELO SANGUE, ESPERMA OU LEITE MATERNO.
SE NÃO TRATADA, PODE EVOLUIR PARA UM QUADRO CRÔNICO,
CIRROSE OU ATÉ CÂNCER DE FÍGADO.

HEPATITE C

TRANSMITIDA PELO SANGUE INFECTADO. APESAR DE RARO,
O VÍRUS É TRANSMITIDO PELO SEXO OU AMAMENTAÇÃO.
SE NÃO TRATADA, PODE CAUSAR CIRROSE HEPÁTICA.

HEPATITE D

OCORRE APENAS EM PESSOAS JÁ INFECTADAS PELO TIPO B
DA DOENÇA. TRANSMITIDA POR RELAÇÕES SEXUAIS,
DA MÃE PARA O FILHO DURANTE A GESTAÇÃO, PARTO OU
AMAMENTAÇÃO, COMPARTILHAMENTO DE SERINGAS, AGULHAS,
CACHIMBOS E OBJETOS DE HIGIENE PESSOAL CONTAMINADOS.



QUAIS AS FORMAS DE?

CONTÁGIO

A MAIORIA DAS DST'S SÃO CAUSADAS PELA FALTA DO USO DE PRESERVATIVOS DURANTE A PENETRAÇÃO OU PELO CONTATO DIRETO COM SÊMEN, FLUIDOS VAGINAIS, SANGUE, FERIDAS ABERTAS OU COMPARTILHAMENTO DE SERINGAS, QUE POSSIBILITAM QUE O VÍRUS TENHA ACESSO À CORRENTE SANGUÍNEA E SE INSTALE NO ORGANISMO.

SALIVA CONTAMINA?

A saliva possui níveis muito baixos da carga viral, por isso a transmissão por beijo na boca é rara. O risco existe apenas se a pessoa tiver uma ferida bucal aberta.

E OS OBJETOS PESSOAIS?

Apesar de pouco comum, o contágio por compartilhar objetos de uso pessoal como toalha de banho, escova de dentes e roupas íntimas pode acontecer.

FAÇA SEU

DIAGNÓSTICO

O DIAGNÓSTICO PRECOCE FAZ TODA A DIFERENÇA NO SUCESSO DO TRATAMENTO.
CASO SURJA ALGUM SINAL ANORMAL, PROCURE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE.

OS ESPECIALISTAS MAIS INDICADOS PARA TE ORIENTAR SÃO:
DERMATOLOGISTA, CLÍNICO GERAL, INFECTOLOGISTA, UROLOGISTA E GINECOLOGISTA.



APESAR DE ALGUMAS DOENÇAS APRESENTAREM SINTOMAS SEMELHANTES

NUNCA SE AUTOMEDIQUE

EXISTEM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA UMA DELAS.

SEMPRE PROCURE UM MÉDICO PARA REALIZAR EXAMES DIAGNÓSTICOS E,
A PARTIR DOS RESULTADOS, INICIAR O TRATAMENTO CORRETO.

INDEPENDENTE DA DST TER CURA, É MUITO IMPORTANTE SEGUIR CORRETAMENTE
O TRATAMENTO PARA ELIMINAR OS SINTOMAS E A POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÕES.

Se você for diagnosticado com alguma DST,

não deixe de informar seu parceiro ou parceira para que ele ou ela

também procure um médico e se preciso, inicie o tratamento.

PREVENÇÃO

O PRESERVATIVO, TANTO MASCULINO QUANTO FEMININO,
É A MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO

ALGUNS VÍRUS CAUSADORES DAS DST'S PODEM NÃO APRESENTAR SINTOMAS
OU FICAR ENCUBADOS NO CORPO SEM SE MANIFESTAR POR ANOS,
MAS MESMO ASSIM PODEM SER TRANSMITIDOS.
POR ISSO, NÃO DEIXE DE FAZER SEUS EXAMES PREVENTIVOS.


**CASO VOCÊ ESTEJA GRÁVIDA, NÃO DEIXE DE FAZER O EXAME DE SÍFILIS, E SE PRECISO,
REALIZAR O TRATAMENTO CORRETAMENTE PARA PREVENIR QUE O BEBÊ SEJA INFECTADO.**



→ saúde

TAMBÉM É

responsabilidade
de cada um



PRODUZIDO POR

IT'S SEG

SEGUROSINTELIGENTES.COM.BR